PRACTICE BOOK

18+ Коллекционный номер Облик. Esthetic Guide 4 (53) 2023

Bellarti®

Ты создана сиять



РУ РЗН 2020/12181 от 07.10.2020
ООО «ГРОТЕКС», 195279, Россия, г. Санкт-Петербург,
Индустриальный пр., дом 71, корпус 2, литера А

SOLOPHARM

bellarti.ru

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ВРАЧЕЙ. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУР ДАННЫМ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И НАВЫКОВ. ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫХ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.

РЕКЛАМА

Эффект лифтинга и уменьшение проявлений розацеа

Авторская методика применения препаратов Bellarti для решения проблемы купероза и одновременного достижения лимфодренажного и лифтингового эффекта.

Анастасия Ромашкина

к. м. н.,
врач-дерматовенеролог,
косметолог, трихолог,
физиотерапевт, Москва

romashkinaas

Введение

В последнее время количество пациентов с розацеа неуклонно растёт. При этом запрос при обращении к косметологу, как правило, заключается в комплексном решении сразу нескольких проблем: уменьшение эритемы и склонности к покраснению кожи, а также улучшение качества кожи и лифтинг.

Для решения данных задач рекомендован курс биоревитализации препаратами Bellarti Hydrate и Bellarti Lift, проводимый по патогенетически обоснованным схемам. Гиалуроновая кислота восстанавливает уровень увлажнённости кожи, поддерживает гомеостаз межклеточного пространства, тем самым способствует активности фибробластов, оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие. Маннитол нормализует микроциркуляцию и трофику тканей, уменьшая проявления розацеа в виде склонности к возникновению эритемы, а также оказывая дренажное действие. Глицерол способствует длительному эффекту гидратации после процедур. В результате процедуры отмечается уменьшение эритемы, отёчности, увлажнение и лифтинг.

Материалы и методы

Для пациентов с розацеа и чувствительной кожей первой методикой, с которой начинается косметологический протокол коррекции, может являться методика биоревитализации. Препарат выбора должен содержать минимальное количество компонентов для снижения риска возможной реактивности кожи, поэтому рекомендованы препараты Bellarti Hydrate (содержит гиалуроновую кислоту и маннитол) и Bellarti Lift (содержит гиалуроновую кислоту и глицерол).

Протокол процедуры

Курс состоит из трёх процедур, проводимых с интервалом в две недели. В первой и второй процедурах инъецируется препарат Bellarti Hydrate 2,0 мл, в третьей процедуре — Bellarti Hydrate, 1,0 мл и Bellarti Lift, 2,0 мл.

1. Демакияж, очищение кожи мягкими средствами без кислот.
2. Обработка лица раствором хлоргексидина биглюконата 0,05 %.
3. С целью минимизации риска аллергической реакции и/или покраснения кожи не рекомендуется нанесение аппликационной анестезии у пациентов с розацеа и чувствительной кожей.
4. Инъецирование препарата Bellarti Hydrate в технике папульных инъекций, игла 30, 32 или 33G. Инъекции проводятся с учётом лимфооттока:

- от середины лба к преаурикулярным лимфатическим узлам,
- от нижнего века к преаурикулярным лимфатическим узлам,
- от крыла носа вдоль носогубной складки к поднижнечелюстным лимфатическим узлам,
- от нижней губы к поднижнечелюстным лимфатическим узлам,
- вдоль нижней челюсти от подбородочных лимфатических узлов через поднижнечелюстные лимфатические узлы к преаурикулярным лимфатическим узлам,
- по ходу грудино-ключично-сосцевидной мышцы к надключичным лимфатическим узлам.

Отдельно в технике микропапульных инъекций обрабатывается область щёк, крыльев носа и подбородка.

5. Инъецирование препарата Bellarti Lift (третья процедура) в бугорковой технике, игла 30G, по 20 точкам, симметрично справа и слева:
- 1-ая точка — 3 см над медиальным краем брови,
- 2-ая точка — 2 см над латеральным краем брови,
- 3-ья точка — латеральная точка скуловой дуги,
- 4-ая точка — середина носогубной складки,
- 5-ая точка — 1 см от козелка,
- 6-ая точка — подбородок на 1 см от среднеподбородочной линии,
- 7-ая точка — подбородок в проекции губоподбородочной складки,
- 8-ая точка — угол нижней челюсти,
- 9, 10-ая точки — равномерное распределение по линии, соединяющей четвёртую и пятую точки.

6. Обработка лица раствором хлоргексидина биглюконата 0,05 %.
7. Нанесение противовоспалительного крема («Бепантен», La Roche-Posay Cicaplast, «Траумель»).

Выбранный метод решает комплекс нескольких проблем: уменьшение эритемы и склонности к покраснению, улучшение качества кожи и лифтинг.

Результаты коррекции

После первой процедуры отмечается уменьшение покраснения кожи, дренажный эффект. После второй процедуры дренажный эффект продолжает нарастать, периодическое появление эритемы кожи отсутствует, отмечается выраженное увлажнение кожи.

После третьей процедуры отмечается стойкий эффект отсутствия признаков склонности к появлению эритемы, дренажный эффект в виде уменьшения отёчности в периорбитальной области, появление эффекта похудевшего лица, увлажнение кожи, выравнивание тона, лифтинг в виде уменьшения глубины носогубных складок, более чёткого овала лица.

Заключение

Разработанный протокол может эффективно использоваться как процедура лифтинга и одновременно терапии кожи у пациентов с розацеа и чувствительной кожей. ●



Производитель — компания Solopharm, bellarti.ru